



پرورش دامهای مرتعی

عنوان شغل:

پرورش گوسفند

کد شغل: ۶۱۲۱۱۲۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

کنترل سلامت گوسفند

کد شایستگی: ۶۱۲۱۱۰۰۰۰۳

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- در روش تالی های جهت پشم چینی مقید کردن دام چگونه می باشد.

الف- بستن دست و پای گوسفندان

ب- مهار حیوان با پا و زانوی شخص پشم چین

ج- بستن فقط یک دست یا یک پا

د- نگهداشت حیوان در محوطه تنگ

۲- نحوه مهار گوسفند جهت جلوگیری از بریدن پستان در پشم چینی چگونه می باشد. (به ترتیب از چپ به راست)

۱. گوسفند را حدود ۹۰ درجه بچرخانید ۲. پشم چینی را از پشت پا چپ شروع کرده و تا ناحیه ستون فقرات

ادامه دهید ۳. زانوی راست شما در مقابل سینه گوسفند باشد ۴. دست راست گوسفند بین پاهای شما مهار شود

الف- ۱-۲-۳-۴

ب- ۱-۳-۴-۲

ج- ۱-۴-۳-۲

د- ۱-۲-۴-۳

۳- جهت چیدن پشم ناحیه سینه گردن و چانه کدام ترتیب از چپ به راست صحیح می باشد.

۱. پای راست خود را بین پاهای عقبی گوسفند ۲. بدن گوسفند را بین زانوهای خود مهار کنید ۳. پای چپ خود

به ستون فقرات گوسفند تکیه دهید ۴. از دست چپ خود برای عقب نگه داشتن سر گوسفند استفاده نمایید

الف- ۱-۲-۳-۴

ب- ۱-۳-۴-۲

ج- ۱-۳-۴-۲

د- ۱-۲-۴-۳

۴- جهت چیدن پشم ناحیه پشت گوسفند کدام فراین صحیح نمی باشد.

الف- گوسفند را در امتداد ساق پا خود بلند کرده و به سمت راست متمایلش کنید

ب- پای راست خود را بین پاهای عقب او و پای چپ خود را زیر شانه اش نگه دارید

ج- پای راست خود را کمی چرخش داده تا بینی گوسفند در بین پاهای شما جای گیرد

د- ماشین پشم چین را در انتهای دم قرار داده، یک ضربه طولانی از ناحیه سر شروع و به موازات با ستون فقرات

گوسفند پیش بروید

۵- در مهار گوسفند برای پشم چینی کدامیک صحیح نمی باشد.

الف- برش های دوم در پشم چینی حتما انجام شود

ب- یکی از راه های حرفه ای بودن در این کار استفاده از ضربات طولانی و مطمئن است

ج- وقتی پوست گوسفند کشیده شود، برش پشم راحت تر انجام می شود

د- برای گوسفندان دارای پشم ریز کشیده شدن پشم حتما ضروری است

۶- اولین و مهمترین نکته ای که توجه دامدار را هنگام بیماری گوسفند جلب می کند کدام است؟

الف- تغییر در مخاط بدن

ب- تغییر در کاهش وزن

ج- تغییر در اشتهای دام

د- تغییر در کاهش تولید

۷- برای تشخیص چاقی یا لاغری گوسفند از استفاده می شود. (از لحاظ ظاهر)

الف- لمس کردن مهره پشت حیوان

ب- وزن کردن

ج- نر یا ماده بودن

د- ظاهر شکم

۸- در بررسی دهان و بینی حیوان به طوری که اگر آبریزش با ترشحات چرکی دیده شود می توان گفت که

حیوان دارد.

الف- نارسایی کبد

ب- نارسایی ریه

ج- نارسایی قلب

د- نارسایی فک

۹- در بررسی ظاهری در صورتی که پشم گوسفند به راحتی کنده نمی شود گوسفند سالم و اما در گوسفندی که

دارای باشد به راحتی پشم از بدن جدا خواهد شد.

الف- نارسایی کبد

ب- نارسایی ریه

ج- نارسایی قلب

د- نارسایی فک

۱۰- کدامیک از علائم مشخصات ظاهری گوسفند سالم نمی باشد.

الف- گوسفند سالم به صورت مداوم غذا می خورد و بی اشتها نیست

ب- داشتن چشمی براق و شفاف

ج- بررسی پشم های گوسفند که به راحتی کنده نمی شود

د- عدم نشخوار

۱۱- اگر چشم و بینی گوسفند دارای ترشحاتی چرکی بود یعنی گوسفند از لحاظ مشکل دارد.

الف- ریوی

ب- کبدی

ج- کلیوی

د- قلبی

۱۲- کدامیک را می توان از علائم بیماری در گوسفند دانست. (از روی ظاهر)

الف- در ذبح ، جگر گوسفند سالم دارای رنگ جگری است و رگه ای در آن دیده نمی شود

ب- مدفوع خیلی نرم و یا سفت

ج- نشخوار مداوم حیوان

د- گوسفند زنده سالم حتما باید اشتهای کافی داشته باشد و همراه دیگر گوسفندان غذا بخورد

۱۳- در دام های سالم غشای مخاطی در مخاط پوزه، چشم و پلک و سوراخ های بینی صاف بوده و رنگ آن.....

است اما در دام ها و گوسفند ناسالم این مخاط به رنگ تغییر رنگ می دهد و به شکل عفونی است.

الف- صورتی- زرد

ب- زرد- صورتی

ج- صورتی- قرمز

د- زرد- قرمز

۱۴- درارتباط با راههای ظاهری تشخیص گوشت سالم، کدامیک صحیح نیست.

الف- گوشت سالم باید به رنگ قرمز روشن باشد

ب- سطح گوشت سالم لزج یا مرطوب است و گوشت نیز خشک می باشد

ج- رنگ قهوه ای ، خاکستری یا سیاه نشانه هایی از فاسد بودن گوشت هستند

د- وجود بو بد و تعفن از مشکلات گوشت می باشد

۱۵- کدامیک از علائم زیر در تشخیص سلامت گوسفند ، نشان دهنده بیماری است.

الف- گوسفند سالم نباید دارای ترشحاتی از بینی و چشم باشد

ب- گوسفند سالم دارای بی اشتهایی، لرزش و عدم تعادل در بدن نمی باشد

ج- علائمی مانند سرفه، سرگیجه، عطسه و اسهال از نشانه های ناسالم بودن گوسفند است

د- اگر گوسفند دچار سقط جنین شود از نشانه های ناسالم بودن گوسفند نمی باشد

۱۶- در ارتباط با شکل عمومی بدن گوسفند، کدامیک صحیح نیست.

الف- طول بدن کشیده وقد مناسب باشد

ب- عرض سینه باید قابل قبول بوده و به هنگام ایستادن دام و مشاهده از روبروی صورت گوسفند، سینه عریض

کاملاً باید مشخص باشد

ج- دنبه مناسب، بزرگ و سنگین از دیگر خصوصیات ظاهری گوسفندان بوده. مفصل خرگوشی در اندام حرکتی

عقب شاخص مناسب اندازه گیری طول دنبه بوده و در دنبه های مناسب، طول دنبه کوتاهتر از این مفصل قرار

می گیرد.

د- کمر و کپل عریض بوده و ظرفیت بالای کپل تاثیر مثبتی در فرایند زایش در گوسفند دارد.

۱۷- گوسفند زنده با نمره صفر کدامیک از ویژگی های زیر را ندارد.

- الف- گوسفندانی هستند که به تازگی از بند بیماری رها شده اند و بسیار لاغر می باشند
ب- گوسفند زنده با نمره صفر اغلب زائده های شوکی و کناری مهره های کمر کاملا مشخصی دارد
ج- خرید آن برای دامدار از لحاظ اقتصادی بسیار مناسب است
د- روی زائده های شوکی و کناری مهره های کمر تنها یک لایه پوست با کمی عضله بین ستون مهره ها قابل لمس است

۱۸- در تقسیم بندی گوسفندان به تیپ بدنی از صفر تا پنج، خریدار باید برای ذبح، گوسفندان با نمره تیپ را تهیه کند.

الف- صفر

ب- یک

ج- دو

د- سه به بالا

۱۹- در رفتار شناسی گوسفند، کدامیک نشان دهنده صحت و سلامتی نمی باشد.

الف- در اوج فصل جفت گیری، قوچ ها میل به خوردن غذا را از دست می دهند

ب- گوسفندان سالم از الگوهای خوردن و نشخوار طبیعی پیروی می کنند

ج- گوسفندان سالم به طور طبیعی اشتهای زیادی دارند

د- گوسفند سالم میل به تنهایی و خوردن تکی دارد.

۲۰- کدامیک از فاکتورهای رفتاری زیر باعث شک دامدار به بیماری نمی شود.

الف- چشم پوشی از خوراک حین جفت گیری در قوچ ها

ب- عقب ماندن در حین خروج از جایگاه

ج- روی آوردن گوسفند به گند خواری

د- عدم تمایل به خوراک

۲۱- کدام مورد در رفتار شناسی گوسفندان به جهت بیماری مهم هستند. (کامل ترین گزینه)

الف- انزوا و عدم تمایل به خوراک

ب- سستی و بی حالی

ج- مدفوع غیر طبیعی

د- تنفس شدید، سستی و بی تحرکی ، مدفوع غیر طبیعی ، انزوا و عدم میل به خوراک

۲۲- کدامیک از نشانه های ترس در گوسفندان نمی باشد.

الف- بی حرکت ایستادن

ب- اشتهای زیاد به خوراک

ج- سم بر زمین کوفتن

د- خیره شدن به روبه رو با گوش هایی به سمت عقب

۲۳- در ارتباط با شکل رفتاری با محیط در گوسفندان کدام مورد صحیح نیست.

الف- بینایی مطلوبی ندارند

ب- شنوایی بالایی دارند

ج- لوازم الکتریکی و سیستم صوتی در اطراف آن‌ها آرامش بخش خواهد بود

د- بهتر است در مکان های تاریک از نور استفاده شود

۲۴- در رفتار شناسی بره ، کدام مورد صحیح نمی باشد.

الف- بره هایی که تمام مدت سروصدا می کنند، احتمالا گرسنه هستند

ب- بازی کردن بره ها پس از ۴ ماهگی افزایش می یابد و با افزایش سن وابستگی بیشتری به مادر پیدا می کنند

ج- بره های سالم معمولا در هنگام بلند شدن کش و قوس می آیند ولی بره های بیمار به شکل خمیده می ایستند

د- بره ها برای استراحت اغلب به دنبال مادر خود هستند تا در کنار او استراحت کنند

۲۵- در رفتار شناسی گوسفندان، مشخص شد گزینه در گوسفندان بسیار زیاد است. (انتخاب بهترین پاسخ)

الف- گله دوستی و دنباله روی

ب- تک روی و انفرادی

ج- تهاجم و حمله

د- اضطراب

۲۶- کدامیک جزو انگل های داخلی در گوسفند نمی باشد؟

الف- انگل تنیا

ب- انگل قزل قورت

ج- جرب

د- کپلک

۲۷- نام انگلی که با رشد خود سبب از بین رفتن و بیمار شدن کبد دام می شود. علائمی مانند ریزش نا مناسب پشم ، ورم بسیار زیاد در زیر گلوی دام ، کم خونی ، ضعف و لاغری بسیار زیاد از نشانه های آن می باشد.

الف- انگل تنیا

ب- انگل قزل قورت

ج- کنه

د- کپلک

۲۸- انگلی که در مناطق پر بارش رشد می نمایند و از طریق علوفه ی آلوده وارد بدن دام شده و آسیب های جدی را برای دام به ارمغان می آورند. از علائم وجود این انگل ، مشکلات ریوی و مشکلات معده برای دام خواهد

بود.

الف- انگل تنیا

ب- انگل قزل قورت

ج- شپش

د- کپلک

۲۹- کدامیک جزو انگل های خارجی محسوب می شود.

الف- انگل تنیا

ب- انگل قزل قورت

ج- شپش

د- کپلک

۳۰- در صورت وجود انگل در دام کدامیک از اتفاقات زیر در واحدهای دامی نمی افتد.

الف- افزایش تولید شیر

ب- انتقال عوامل بیماریزا

ج- ایجاد خسارت به پوست وچرم و فرآورده های دامی

د- کاهش بازدهی دام به علت ایجاد بیماری پوستی، کم خونی، لاغری و کاهش رشد دام

۳۱- کدامیک از روشهای بیولوژیک مبارزه با انگل در دام می باشد.

الف- برداشتن مستقیم از سطح بدن دام

ب- پرتو افکنی و بهره بردن از رادیو اکتیو

ج- استفاده از حمام ضد کنه

د- استفاده از محلول های شیمیایی

۳۲- در ارتباط با انگل های خارجی کدامیک صحیح نمی باشد.

الف- حمام در مجموع بهترین و رایج ترین وسایل مبارزه بر علیه انگلهای خارج بدن دام می باشد

ب- مهمترین بیماری که توسط کک ها انتقال پیدا می کند طاعون است.

ج- استفاده از انواع سموم حشره کش در مبارزه با این انگلها موثر نمی باشد و فقط حمام تنها گزینه مناسب

است.

د- شپش ها باعث کاهش اشتها و استرس در دام می شوند و همچنین باعث کلفت شدن پشم حیوان و پیچیدگی

در آن نیز می شوند

۳۳- در مبارزه با انگل های خارجی و در مورد استفاده از حمام کدام مورد درست نمی باشد.

الف- دامهای خسته، زخمی، ضعیف، تشنه، فحل و آبستن سنگین هرگز نباید حمام کنند

ب- دامهای تشنه پیش از حمام سیراب شوند

ج- بعد از حمام، دامها باید به مدت طولانی زیر آفتاب بمانند تا کاملا خشک شوند.

د- بهتر است زمان استحمام با زمان فعالیت انگلها(بخصوص کنه ها) هماهنگ باشد و فواصل استحمام حداکثر ۱۰ روز باشد

۳۴- نام دیگر کپلک در دام چیست.

الف- کرم معده

ب- کرم ریوی

ج- کرم کبد

د- کرم روده

۳۵- نام دیگر انگل تنیا در گوسفند چیست.

الف- کرم معده

ب- کرم ریوی

ج- کرم کبد

د- کرم روده

۳۶- نام دیگر انگل قزل قروت چیست.

الف- کرم معده - ریوی

ب- کرم روده

ج- کرم کبد

د- کرم کدو

۳۷- در ارتباط با انگل های معدی- ریوی یا قزل قروت کدام مورد صحیح نمی باشد.

الف- این انگل از نوع کلستریدیوم می باشد

ب- وجود این انگل در بدن حیوان باعث ضعف، لاغری، مشکلات تنفسی، اسهال سیاه و قهوه ای و حتی شکستگی پشم می شود

ج- این انگل بیشتر در مناطق پر باران مشاهده می شود

د- برای از بین بردن این انگل باید از داروی ضد انگل برای خوراندن گوسفندان استفاده شود

۳۸- کدامیک از نشانه های بیماری های انگلی در گوسفندان نیست.

الف- کم خونی

ب- آبستن نشدن گوسفندان

ج- ریزش پشم گوسفندان و رشد نامطلوب

د- افزایش ناگهانی وزن

۳۹- برای محاسبه مقدار تزریق داروی آیورمکتین به گوسفند جهت درمان بیماری انگلی وزن دام باید تقسیم بر

عدد شود.(برای گوسفند بیش از ۵۰ کیلوگرم)

الف- ۲۰

ب- ۳۰

ج- ۴۰

د- ۵۰

۴۰- در ارتباط با انگل جرب کدام مورد صحیح نیست.

الف- این انگلهای خارجی بسیار ریز هستند و عامل گال یا گری هستند

ب- امراض جربی مسری نیستند و دام آلوده سریعاً بهبود می یابد

ج- این انگل پس از رسیدن به پوست در آن نفوذ کرده و باعث ایجاد خارش شدیدی در بدن دام می شود

د- در اثر ابتلا به جرب زخم ها و جراحات پوستی ایجاد می شوند

۴۱- در ارتباط با شپش ها کدام مورد صحیح نیست.

الف- شپش ها جز انگلهای خارجی است

ب- بیشتر در مناطق کم موی بدن جاندار قرار داشته و از دامی به دام دیگر قابل سرایت است

ج- این حالت بیشتر در فصل گرما و زمانی که دام ها به صورت پراکنده نگهداری می شوند و غذای مناسب در

اختیار آنها قرار میگیرد، ایجاد می شود

د- میزان شیر و گوشت در دام های مبتلا به شپش کاهش یافته. همچنین پشم آن ها نیز زمخت شده، پیچیدگی

پیدا می کند

۴۲- کدام بیماری زیر توسط کنه به دام منتقل می شود.

الف- زبان آبی

ب- خون شاش

ج- کوکسیدیوز

د- هیداتوزیس

۴۳- کدامیک جزو داروی اختصاصی برای درمان بیماری فاسیلوز در نشخوار کنندگان محسوب می شود.

الف- تریکلابندازول

ب- مبندازول

ج- لوامیزول

د- تترامیزول

۴۴- اولین قدم برای درمان بیماری های انگلی گوسفندان در این حیوانات است.

الف- تشخیص نشانه های بیماری انگلی

ب- واکسیناسیون

ج- استفاده از آنتی بیوتیک

د- حذف و کشتن

۴۵- در ۴۵ روز اول آبستنی دام آلبندازول مصرف شود.

الف- می تواند

ب- نباید

ج- با احتیاط

د- حتما

۴۶- برای تنفس بره تازه زا کدام روش توصیه نمی شود.

الف- قفسه سینه آن را با ملایمت و به وسیله یک مشت گاه یا یک حوله ماساژ داد

ب- فرو بردن یک پر گاه در بینی بره

ج- آویزان کردن از یک پا و یا پاشیدن آب سرد روی صورت بره

د- فشار آب در سوراخ بینی بره

۴۷- در ارتباط با مراقبت بعد از تولد، کدام دستورالعمل برای بره تازه متولد شده صادق نمی باشد.

الف- بره تازه متولد شده ماک کافی خورده و غذای بره به حد کافی به آن رسیده است.

ب- تزریق دز معینی ویتامین ای (E) یا سلنیم به بره بعد از تولد.

ج- استفاده از کنسانتره بلافاصله بعد از تولد

د- طی نیم یا یک ساعت بعد از تولد، برخاسته و اقدام به شیر خوردن کند

۴۸- در ارتباط با بند ناف کدامیک درست نمی باشد.

الف- بند نافی که طول آن‌ها از ۵ سانتیمتر بیشتر است باید به فاصله‌ای نزدیک‌تر به بدن کوتاه شوند

ب- عفونت بند ناف بواسطه مصرف آغوز توسط بره خودبخود از بین خواهد رفت

ج- تنتورید، بتادین یا کلر هگزیدین از جمله این مواد ضدعفونی‌کننده هستند که می‌توان آن‌ها را به بند ناف

اسپری کرد

د- بند ناف بره تازه یکی از راه‌هایی است که ممکن است عوامل عفونت‌زا به بدن وارد شده و باعث بیماری بره یا

حتی مرگ بره شود

۴۹- در ارتباط با ماک با آغوز کدام صحیح نمی باشد.

الف- اولین شیر تولید شده بعد از زایمان در پستان مادر، ماک یا آغوز نامیده می‌شود

ب- از آنجایی که آغوز حاوی مقدار زیادی پادتن است برای سلامتی بره تازه متولد شده و ایمنی آن در مقابل

بیماری‌ها در بره، ضروری است

ج- پادتن‌ها مولکول‌های پروتئینی هستند که در ۲۴ تا ۳۶ ساعت بعد از تولد امکان عبور از دیواره روده را

داشته و می‌توانند وارد جریان خون شوند

د- مقاومت بدن بره بعد از تولد بدون ماک هم بالا خواهد بود و سیستم ایمنی بالاتری خواهد داشت

۵۰- در ارتباط با مواد تشکیل دهنده ماک، کدام مورد صحیح نمی باشد.

الف- سرشار از ویتامین گروه A می باشد

ب- ماک یا آغوز منبع تامین ویتامین ای (E) بره‌ها نیز هست

ج- مقدار آهن موجود در این غذای بره ۱۰ تا ۱۷ برابر بیش تر از آهن موجود در شیر طبیعی است
د- ماک‌هایی که کیفیت بالا داشته باشند کمتر از ۱۰ میلی گرم «ایمونوگلوبولین جی» دارند. غلظت آن در ماک، بعد از زایمان افزایش پیدا می‌کند

۵۱-دمای ماک دریافتی بره باید بیندرجه سانتیگراد (دمای خون بدن) باشد.

الف- ۲۰ تا ۲۵

ب- ۳۹ تا ۴۰

ج- ۲۵ تا ۳۰

د- ۳۰ تا ۳۵

۵۲- اگر قبل از اقدام به شیر دوشی مقداری «اکسی‌توسین» به صورت وریدی یا درون ماهیچه‌ای به میش تزریق شود مقدار ماک حاصل شده را..... داده و جاری شدن آن را نیز می‌کند.

الف- افزایش - آسان

ب- افزایش - دشوار

ج- کاهش - آسان

د- کاهش - دشوار

۵۳- استفاده از حرارت مستقیم و بالا جهت خارج نمودن ماک از حالت انجماد، موجبپادتن‌های موجود در ماک می‌شود.

الف- تقویت

ب- از بین رفتن

ج- افزایش

د- تاثیری در کیفیت پادتن‌ها ندارد

۵۴- کدام فاکتور در گرسنگی بره بعد از تولد نقش ندارد.

الف- مصرف ناکافی ماک

ب- ورم پستان میش

ج- بیماری و صدمات مفصلی

د- عدم وجود علوفه و کنسانتره

۵۵- در ارتباط با تلفات بره ، بیشترین نرخ مرگ و میر مربوط است به

الف- سقط جنین

ب- نقص‌های تولد

ج- گرسنگی و سوتغذیه

د- حوادث و شکارگرها

۵۶- در ارتباط با نحوه مراقبت از بره‌ها بعد از تولد کدامیک صحیح نمی‌باشد.

- الف- جدا کردن بره از مادر بلافاصله بعد از تولد مهمترین روش مدیریتی در حفظ سلامت بره می باشد
- ب- هنگام تولد، بند ناف از فاصله ۳ تا ۴ سانتی متری بریده شود و سپس با تنتورید ضد عفونی گردد
- ج- هنگام تولد، بره فاقد پشم است و به همین دلیل لیس زده شدن بره توسط مادر، از خشک شدن و اطلاق انرژی بدن بره پیشگیری می کند
- د- دادن آغوز به بره ها در دوازده ساعت اول پس از تولد بسیار مهم می باشد زیرا در این زمان دیواره روده قادر به جذب پادتن ها نمی باشد.

۵۷- آغوز نسبت به شیر معمولی،

الف- لاکتوز کمتری دارد

ب- خاصیت آنتی بادی کمتری دارد

ج- پروتئین کمتری دارد

د- چربی و ویتامین کمتری دارد

۵۸- دمای طبیعی بدن بره (دمای راست روده) حدوددرجه سانتی گراد است.

الف- ۳۵

ب- ۳۷

ج- ۳۹

د- ۴۳

۵۹- معمولاً زمان آبستنی در مادران باردار با بره‌های نر از بره‌های ماده است و طول آبستنی در مادران دو و یا چند قلوزا نسبت به یک‌قلو باردار نیز است.

الف- بیشتر - کمتر

ب- کمتر - بیشتر

ج- بیشتر - بیشتر

د- کمتر - کمتر

۶۰- کدام مورد در ارتباط با نشانه های زمان زایش، درست نمی باشد.

الف- دو هفته قبل از بره‌زایی پستان‌های میش کم‌کم پر از شیر شده و گاهی پوست آنها قرمز می‌شود

ب- در چند ساعت قبل از زایش رنگ پستان کم رنگ است و فاقد هر گونه تورم

ج- فرج میش آبستن نرم و براق به نظر می‌رسد و بزرگ‌تر می‌شود

د- نشانه قطعی نزدیک شدن زایمان ظاهر شدن کیسه آمنیون از فرج حیوان می‌باشد

۶۱- در مرحله خروج بره از بدن مادر ، کدام مورد صحیح نیست.

الف- انقباضات رحم سبب فشار دست ها و سر بره به پرده های جنینی می شود و آن را پاره می کند

ب- کیسه آب اول (کوریوآلانتوئیس) پاره میشود و کیسه دوم (آمنیون) حدود یک ساعت بعد پاره می شود

ج- هدایت بره به سمت کانال زایمان توسط انقباضات رحم ادامه می یابد

د- ابتدا پاها و در انتها دست و سر خارج می شوند
۶۲- در ارتباط با سخت زایی، کدام فاکتور مربوط به بره می باشد.

الف- رحم (پیچ خوردگی)

ب- عدم تناسب

ج- جفت

د- مهبل

۶۳- در سخت زایی گوسفند، شانس زنده ماندن بره در کدام حالت کمتر است.

الف- مچ بره از فرج خارج شود و سر وارد لگن شده باشد

ب- با ورود دست به فرج اطراف بره فضا داشته باشد

ج- دست های بره در لگن به صورت ضرب دری باشد

د- سم بره در زمان زور زدن از فرج خارج و داخل شود

۶۴- کدامیک از علایم زایمان در دام نمی باشد.

الف- خشک بودن واژن

ب- در هنگام زایمان ، گوسفند به دلیل فشار و انقباضات رحمی شروع به زور زدن می کند

ج- گوسفندها به حالت درازکش روی زمین زایمان کرده و مرتباً شیر از پستان آنها خارج می شود

د- در زمان نزدیک شدن به زایمان کیسه آب آمنیون بیرون آمده و آب زیادی از حیوان خارج می شود

۶۵- برای سزارین گوسفند برش شکمی در کدام سمت از بدن حیوان انجام می شود

الف- چپ شکم

ب- راست شکم

ج- زیر شکم

د- فرقی ندارد

۶۶- اولین اقدام فوری در آسیب های پوستی در دام

الف- خونریزی را در بریدگی عمیق متوقف کنید

ب- موضع را ضد عفونی کنید

ج- حیوان سزیمبا ذبح کنید

د- از درمان دارویی استفاده کنید

۶۷- برای از بین بردن آلودگی و باکتری ها در محل خونریزی باید کدام عمل را انجام داد.

الف- مواد ضد عفونی کننده رقیق، محلول نمکی یا حتی آب استفاده نمود

ب- خونریزی را در بریدگی عمیق متوقف کنید

ج- از کمپرس یخ استفاده نمود

د- از آنتی بیوتیک های موضعی استفاده شود

- ۶۸- روش های درمانی در مواجهه با آبسه بغیر از کدام گزینه صحیح می باشد.
- الف- مقداری مو را از محل جدا کرده و با یک پارچه مرطوب بشویید. زخم باز می شود تا چرک از آن خارج شود
- ب- از الکل یا پراکسید هیدروژن برای شستشوی زخم استفاده کنید
- ج- برای تخلیه زخم فشار وارد کنید اما ملایم، در غیر این صورت چرک به زور از آبسه خارج شده و به جریان خون باز می گردد
- د- به محض تشخیص آبسه از آنتی بیوتیک استفاده کنید
- ۶۹- در ارتباط با زخم بسته کدام مورد انجام نمی شود.
- الف- خونریزی زیر پوست نیز به نام کبودی وجود دارد
- ب- بافت های نرم مانند تاندون ها، ماهیچه ها و رباط ها و بافت های سخت مانند استخوان درگیر می شود
- ج- بیشتر زخم های بسته در نتیجه ضربه های قوی ایجاد می شوند که به لایه های بافت نرم زیر پوست آسیب می رساند و باعث خونریزی داخلی می شود
- د- از ضد عفونی به مقدار زیاد در محل و اطراف محل استفاده کنید
- ۷۰- **Foot Rot** نام دیگر کدام بیماری در دام می باشد.
- الف- پوسیدگی پا
- ب- عفونت های قارچی
- ج- پارگی پستان
- د- آبسه
- ۷۱- در ارتباط با مراقبت اولیه در موارد اورژانسی شکستگی ها در دام کدام مورد نادرست می باشد.
- الف- محدود کردن التهاب
- ب- فراهم کردن بی دردی مناسب
- ج- افزایش راحتی و کاهش حرکت دام
- د- سیستم خورسانی به بافت شکسته شده مختل شود
- ۷۲- جهت جلوگیری از لنگش دام کدام اقدام اولیه را جهت حمایت حیوان باید انجام داد.
- الف- با بردن به موقع سم گوسفندان میتوان کنترل کرد
- ب- سم های گوسفندان را در حوضچه محلول سولفات روی خیس کنید
- ج- واکسیناسیون همچنین می تواند به جلوگیری و حتی درمان از این بیماری کمک کند
- د- کشتار حیوان در اسرع وقت
- ۷۳- کدامیک در ارتباط با زخم های غیر نفوذی درست نمی باشد.
- الف- وارد شدن جسم نوک تیز، از یکطرف و خروج، از طرف دیگر است
- ب- خونریزی، کم و درد، زیاد است
- ج- احتمال ایجاد عفونت و آبسه های عمقی، وجود دارد

د- در اثر ورود اجسام نوک تیز مثل میخ، تراشه چوب، خرده شیشه و شاخ و چنگال‌های بلند، ایجاد می‌شود
۷۴- اقدامات فوری در آسیب‌های پوستی در دام کدامند. (پاسخ کامل)

الف- کنترل خونریزی

ب- محافظت در برابر آلودگی و جراحات بعدی

ج- پاک کردن و شستشوی زخم

د- کنترل خونریزی، پاک کردن و شستشوی زخم و محافظت در برابر آلودگی و جراحات بعدی

۷۵- شکسته شدن پیوستگی بافت‌های بدن (پوست، مخاطات و بافت‌های نرم)، در اثر ضربهنام دارد.

الف- عفونت

ب- زخم

ج- سوختگی

د- کنده شدن

۷۶- در ارتباط با ذبح دام کدامیک صحیح نمی باشد.

الف- گوشت تازه را قبل از مصرف ۲۴ ساعت در دمای یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتی گراد) نگهداری نمائید

ب- در هنگام ذبح دام حتماً از دستکش و عینک کار استفاده گردد

ج- از هرگونه تماس با انگل یا موجود خارجی روی پوست و پشم دام (کنه ، کک و ...) خودداری گردد

د- دل و جگر تازه دام را می توان بعد از ذبح سریعاً مصرف نمود.

۷۷- از مهمترین نکات بهداشتی در مصرف گوشت این است که گوشت تازه را قبل از مصرف در دمای یخچال

(صفر تا ۴ درجه سانتی گراد) نگهداری نمائیم.

الف- ۱ ماه

ب- ۲ ماه

ج- ۲۴ ساعت

د- ۱ ساعت

۷۸- کدامیک در مورد ذبح دام صحیح نمی باشد.

الف- در ذبح گوسفند باید مری و دو شریان کنار حلقوم به طور کامل قطع شود

ب- باید چهار رگ اصلی به طور کامل بریده شود زیرا درست قطع نشدن این رگ ها باعث لخته شدن خون می شود

ج- برای اینکه عمل ذبح کامل بهداشتی باشد بریدن سر را باید از برآمدگی زیر گلو(حلق) شروع کنند

د- بریده شدن مری و دو شاهرگ اطراف آن جهت ذبح دام نیازی نیست

۷۹- کدامیک به عنوان مستحبات و مکروهات ذبح گوسفند انجام نمی شود.

الف- در هنگام ذبح می توانید دست و پای گوسفند را باز بگذارید

ب- توصیه می شود در هنگام عمل ذبح گوسفند رو به قبله باشد

ج- استفاده از از دستگاه های شوک دهنده الکتریکی بهترین گزینه برای بی حس کردن دام است و باید استفاده شود

د- قبل از ذبح مستحب است به گوسفند آب داده شود

۸۰- استفاده از گوشت دام بلافاصله بعد از ذبح ، احتمال ابتلا به بیماری‌هایی مانند را افزایش می‌دهد.

الف- تب مالت

ب- تب کریمه کنگو

ج- سیاه زخم

د- کلیه موارد تب مالت و تب کریمه کنگو و سیاه زخم

